

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et ARA II

Ramipril (TRIATEC®) ; Captopril (CAPTEA® / LOPRIL®) ; Enalapril (RENITEC®) ; Perindopril (COVERSYL®) ; Candesartan (ATACAND® ; KENZEN®) ; Irbesartan (COAPROVEL®) ; Losartan (COZAAR®) ; Telmisartan (MICARDIS) ; Valsartan (TAREG®)

Qu'est-ce que c'est ?

Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 sont des médicaments capables de bloquer l'action d'une hormone qui est responsable de la contraction des vaisseaux sanguins. Ils sont indiqués dans le traitement de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque, du post infarctus du myocarde et en prévention des événements cardiovasculaires.

Ma pression cible est ... mmHg
Mon pouls cible est de ... battements par minutes.

Conseils

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour, en général le matin.
- Votre médecin ajustera la quantité à prendre jusqu'à ce que votre pression artérielle soit contrôlée
- Avisez votre médecin si vous avez des vertiges ou de la toux sèche inexplicée. Si vous constatez un oubli dans les 2 heures, prenez votre médicament immédiatement. Dans les autres cas prenez votre dose suivante à l'heure habituelle. Il ne faut jamais doubler la dose.
- Les 2ème et 3ème trimestres de grossesse et l'allaitement sont des contre-indications.
- Ne pas associer avec un anti inflammatoire (ibuprofène ADVIL®, kétoprofène PROFENID® etc).